

INCRESIL

SILDENAFIL 50 mg

UNA EXPERIENCIA AL MÁXIMO

Medicamento para el tratamiento de la Disfunción Eréctil con pocos efectos secundarios, alta eficacia y fácil administración.

PRESENTACIONES INCRESIL®

25 mg.	50 mg.	100 mg.
x 2 comp.	x 2 comp.	x 2 comp.
x 6 comp.	x 6 comp.	x 6 comp.
x 10 comp.	x 10 comp.	x 10 comp.
x 20 comp.	x 20 comp.	x 20 comp.

Potente inhibidor de la Fosfodiesterasa 5 que aumenta la producción de óxido nítrico favoreciendo la ingurgitación peneana.

Contraindicado en patologías que provoquen insuficiencia cardiovascular

Se recomienda no administrar concomitantemente con Nitratos, Nitritos y Óxido Nítrico.

La Disfunción Eréctil (D.E.), es la incapacidad repetida de lograr o mantener una erección eficaz para tener una actividad sexual satisfactoria.

La alteración de algunos de los mecanismos de la erección, bloqueo de las arterias, incapacidad de los vasos sanguíneos de retener sangre o daño de los nervios del pene o del área pelviana, llevan a una D.E.



PERMATEC
LABORATORIO MEDICINAL S.A.

Combate de los Pozos 336 - Buenos Aires

Tel. / Fax 5411 4382-1454 / 2044

www.permatecsa.com.ar / 0800-222-2211



Placa en relieve con pareja abrazada sobre un lecho
Susa (Khuzistán, Irán sudoccidental)
S. XVI-XV A.C.
Terracota; alt. 3 cm., long. 14 cm., anch. 7 cm.
Teherán, Museo Nacional.

La superficie del lecho se encuentra enmarcada por un reborde labrado en relieve. Las patas de la cama son bajas y en forma de cono truncado. En la superficie se reproducen un hombre y una mujer desnudos, acostados uno junto a otro. Tanto el hombre como la mujer tienen una mano posada en la cintura del compañero, mientras que él toca la mejilla de la mujer con la mano derecha y la mujer rodea su propio seno derecho con la mano izquierda.

En el Louvre se encuentra un relieve de terracota con la misma representación, también de la época medioelamita. (Sb 7979; Spycket 1992, 183-196, 249: relieves de terracota con la misma representación originarios de Susa; cf. Cholidis 1992, tab. 39, núm. 145 (E.B.)

INCRESil

SILDENAFIL 50 mg

Existen situaciones que comúnmente se asocian a la **DISFUNCIÓN ERÉCTIL**:

- DIABETES
- HIPERTENSION ARTERIAL
- EXCESO DE COLESTEROL O TRIGLICÉRIDOS EN SANGRE
- ENFERMEDADES CARDÍACAS
- INTERRUPCIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE EL SISTEMA NERVIOSO Y EL PENE
- MEDICAMENTOS COMO EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS
- DEPRESIÓN

La D.E. es un síndrome muy frecuente que afecta a más de la mitad de los hombres entre 40 y 70 años en menor o mayor grado. Se puede decir, con seguridad, que todo hombre experimenta ocasionalmente una disfunción eréctil y en todos los casos un tratamiento médico puede solucionarlo, por lo que hablar del tema abiertamente con un profesional es lo recomendado.

INCRESil® se presenta en tres dosificaciones y varias presentaciones, lo que indica claramente que el paciente no debe automedicarse.

Por no ser inductor de la erección, para iniciar la liberación local de óxido nítrico, es necesaria la estimulación sexual, ya que el efecto del SILDENAFIL no tiene lugar en ausencia de dicho estímulo.

LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL TIENE REMEDIO:

INCRESil La solución de otro color.



PERMATEC
LABORATORIO MEDICINAL S.A.

Combate de los Pozos 336 - Buenos Aires
Tel. / Fax 5411 4382-1454 / 2044
www.permatecsa.com.ar / 0800-222-2211